

คำแนะนำสำหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (COVID-19)



การเตรียมตัวเพื่อมาฉีดวัคซีน

1 รับประทานอาหารและดื่มน้ำ
ได้ตามปกติ (ห้ามอดอาหาร)

2 มาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลา
นัดอย่างน้อย 15 นาที

3 หากวันดังกล่าวมีอาการป่วย
เช่น ไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย
ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อเลื่อน
การฉีดไปก่อน

4 ลงทะเบียน line official account
"หมอพร้อม" หรือดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน "หมอพร้อม"

หมอ
พร้อม



LINE Official Account
Add ไลน์ IOS 安卓

5 ถ้าท่านได้รับการฉีดวัคซีนตัวอื่น
ภายใน 2-4 สัปดาห์ เช่น วัคซีนป้องกัน
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกัน
บาดทะยัก เป็นต้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อ
เลื่อนการนัดฉีดไปก่อน

คำชี้แจงการรับวัคซีน โควิด 19

1 การได้รับวัคซีน โควิด 19 จำนวน 2 ครั้ง จะลดอาการรุนแรงของโรคภูมิคุ้มกันของร่างกายจะสร้างขึ้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังฉีดวัคซีน



2 ตามมาตรฐานการฉีดวัคซีนและเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการท่าน จะได้รับการคัดกรองและตรวจประเมินสุขภาพก่อนฉีดวัคซีนโดยการวัดสัญญาณชีพก่อนฉีดวัคซีน, ฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติและวัดสัญญาณชีพหลังฉีดวัคซีน 30 นาที และมีระบบติดตามตามอาการหลังฉีดวัคซีน 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน

3 จากข้อมูล "หมอฟร้อม" ในคนไทย ที่ได้รับการติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน อาการที่พบมากที่สุด คือปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด รองลงมา คือ คลื่นไส้ และปวดศีรษะตามลำดับ โดยมีอาการหลังฉีด 1 วัน มากที่สุด (ร้อยละ 4.6) รองลงมา > มีอาการหลังฉีด 7 วัน (ร้อยละ 3.1) > มีอาการหลังฉีด 30 นาที (ร้อยละ 0.8) > มีอาการหลังฉีดเกิน 7 วัน (ร้อยละ 0.4)



อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด19

อาการข้างเคียงชนิดไม่รุนแรง




มีไข้ต่ำ , ปวดศีรษะ



คลื่นไส้ อาเจียน



อ่อนเพลีย



ปวดบริเวณที่ฉีด



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

อาการข้างเคียงรุนแรง

ไข้สูง

แน่นหน้าอก
หายใจไม่ออก

ปวดศีรษะรุนแรง

ปากเขียว
กล้ามเนื้ออ่อนแรง



มีจุดเลือดออก
จำนวนมาก

ตื่นขึ้นทั้งตัว

อาเจียน
มากกว่า 5 ครั้ง

ชัก / หมดสติ

หากมีอาการดังนี้นี้ควรรีบแจ้งแพทย์ทันที

หรือ ☎ สายด่วน 1669